

PROSPECTO

MONTELUKAST APHAR 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Contenido del prospecto:

1. Qué es MONTELUKAST APHAR 10 mg y para qué se utiliza
2. Antes de tomar MONTELUKAST APHAR 10 mg
3. Cómo tomar MONTELUKAST APHAR 10mg
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de MONTELUKAST APHAR 10mg
6. Información adicional

1. QUÉ ES MONTELUKAST APHAR 10 mg Y PARA QUÉ SE UTILIZA

MONTELUKAST APHAR 10 mg es un antagonista del receptor de leucotrienos que bloquea unas sustancias llamadas leucotrienos. Los leucotrienos producen estrechamiento e hinchazón de las vías respiratorias en sus pulmones y también puede causar síntomas de alergia.

Al bloquear los leucotrienos, MONTELUKAST APHAR 10 mg mejora los síntomas del asma, ayuda a controlar el asma y mejora los síntomas de la alergia estacional (también conocida como fiebre del heno o rinitis alérgica estacional).

Su médico le ha recetado MONTELUKAST APHAR 10 mg para tratar el asma y prevenir los síntomas de su asma durante el día y la noche.

- MONTELUKAST APHAR 10 mg se utiliza para el tratamiento de los pacientes desde los quince años de edad o más que no están adecuadamente controlados con su medicación y necesitan tratamiento adicional.
- MONTELUKAST APHAR 10 mg también ayuda a prevenir el estrechamiento de las vías aéreas provocado por el ejercicio en pacientes desde los quince años de edad o más.
- En aquellos pacientes asmáticos en los que MONTELUKAST APHAR 10 mg está indicado para el asma, también puede proporcionar alivio sintomático de la rinitis alérgica estacional.

Dependiendo de los síntomas y de la gravedad de su asma, su médico determinará cómo debe usar MONTELUKAST APHAR 10 mg.

¿Qué es el asma?

El asma es una enfermedad crónica.

El asma incluye:

- dificultad al respirar debido al estrechamiento de las vías respiratorias. Este estrechamiento de las vías respiratorias empeora y mejora en respuesta a diversas enfermedades.
- vías respiratorias sensibles que reaccionan a muchas cosas, como el humo de los cigarrillos, el polen, o el aire frío, o el ejercicio.
- hinchazón (inflamación) de la capa interna de las vías respiratorias.

Los síntomas del asma incluyen: Tos, silbidos y congestión en el pecho.

¿Qué son las alergias estacionales?

Las alergias estacionales (también conocidas como fiebre del heno o rinitis alérgica estacional) son una respuesta alérgica a menudo causada por el polen aéreo de árboles, césped y maleza. Los síntomas de las alergias estacionales típicamente pueden incluir: nariz congestionada, catarro, picor de nariz, estornudos; ojos llorosos, hinchados, rojos y que pican.

2. ANTES DE TOMAR MONTELUKAST APHAR 10 mg

Informe a su médico de cualquier alergia o problema médico que usted tenga ahora o haya tenido.

No tome MONTELUKAST APHAR 10 mg si usted

- es alérgico (hipersensible) a montelukast o a cualquiera de los demás componentes de MONTELUKAST APHAR 10 mg. (véase 6. INFORMACIÓN ADICIONAL).

Tenga especial cuidado con MONTELUKAST APHAR 10 mg

- Si su asma o respiración empeora, informe a su médico inmediatamente.
- MONTELUKAST APHAR 10 mg oral no está indicado para tratar crisis de asma agudas. Si se produce una crisis, siga las instrucciones que le ha dado su médico. Tenga siempre su medicación inhalada de rescate para crisis de asma.
- Es importante que usted o su hijo utilicen todos los medicamentos para el asma recetados por su médico. MONTELUKAST APHAR 10 mg no debe sustituir a otras medicaciones para el asma que su médico le haya recetado.
- Cualquier paciente que esté siendo tratado con medicamentos contra el asma, debe ser consciente de que si desarrolla una combinación de síntomas tales como enfermedad parecida a la gripe, sensación de hormigueo o adormecimiento de brazos o piernas, empeoramiento de los síntomas pulmonares, y/o erupción cutánea, debe consultar a su médico.
- No debe tomar aspirina o medicamentos antiinflamatorios (también conocidos como medicamentos antiinflamatorios no esteroideos o AINEs) si hacen que empeore su asma.

Uso en niños

MONTELUKAST APHAR 10 mg es para adolescentes de 15 años de edad o más y adultos.

Para niños de 2 a 5 años, 4 mg comprimidos masticables están disponibles..

Para niños de 6 a 14 años de edad, 5 mg comprimidos masticables están disponibles.

Uso de otros medicamentos

Algunos medicamentos pueden afectar al funcionamiento de MONTELUKAST APHAR 10 mg, o MONTELUKAST APHAR 10 mg puede afectar al funcionamiento de otros medicamentos que esté utilizando.

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Antes de tomar MONTELUKAST APHAR 10 mg, informe a su médico si está tomando los siguientes medicamentos:

- fenobarbital (usado para el tratamiento de la epilepsia)
- fenitoína (usado para el tratamiento de la epilepsia)
- rifampicina (usado para el tratamiento de la tuberculosis y algunas otras infecciones)

Toma de MONTELUKAST APHAR 10 mg con los alimentos y bebidas

MONTELUKAST APHAR 10 mg puede tomarse con o sin alimentos.

Embarazo y lactancia

Uso en el embarazo

Las mujeres que estén embarazadas o que tengan intención de quedarse embarazadas deben consultar a su médico antes de tomar MONTELUKAST APHAR 10 mg. Su médico evaluará si puede tomar MONTELUKAST APHAR 10 mg durante este periodo.

Uso en la lactancia

Se desconoce si MONTELUKAST APHAR 10 mg aparece en la leche materna. Si está en período de lactancia o tiene intención de dar el pecho, debe consultar a su médico antes de tomar MONTELUKAST APHAR 10 mg.

Conducción y uso de máquinas

No se espera que MONTELUKAST APHAR 10 mg afecte a su capacidad para conducir un coche o manejar máquinas. Sin embargo, las respuestas individuales al medicamento pueden variar. Ciertos efectos adversos (tales como mareo y somnolencia) que han sido notificados muy raramente con MONTELUKAST APHAR 10 mg pueden afectar a la capacidad del paciente para conducir o manejar máquinas.

Información importante sobre algunos de los componentes de MONTELUKAST APHAR 10 mg

Los comprimidos recubiertos con película de MONTELUKAST APHAR 10 mg contienen lactosa. Si su médico le ha dicho que tiene una intolerancia a algunos azúcares, consulte con su médico antes de tomar este medicamento.

3. CÓMO TOMAR MONTELUKAST APHAR 10 mg

- Sólo debe tomar un comprimido de MONTELUKAST APHAR 10 mg una vez al día, como se lo ha recetado su médico.
- Debe tomarse incluso cuando no tenga síntomas o cuando tenga una crisis de asma aguda.
- Tome siempre MONTELUKAST APHAR 10 mg como le haya indicado su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.
- Debe tomarse por vía oral.

Debe tomarse diariamente un comprimido de 10 mg por la noche. MONTELUKAST APHAR 10 mg puede tomarse con o sin alimentos.

Si está tomando MONTELUKAST APHAR 10 mg, asegúrese de que no toma ningún otro producto que contenga el mismo principio activo, montelukast.

Si toma más MONTELUKAST APHAR 10 mg del que debiera

En la mayoría de los casos de sobredosis no se comunicaron efectos adversos. Los síntomas que se produjeron con más frecuencia comunicados en la sobredosis en adultos y en niños fueron dolor abdominal, somnolencia, sed, dolor de cabeza, vómitos e hiperactividad.

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar MONTELUKAST APHAR 10 mg

Intente tomar MONTELUKAST APHAR 10 mg como se lo han recetado. Sin embargo, si olvida una dosis, límitese a reanudar el régimen habitual de un comprimido una vez al día.

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si interrumpe el tratamiento con MONTELUKAST APHAR 10 mg

MONTELUKAST APHAR 10 mg puede tratar su asma sólo si usted continúa tomándolo. Es importante que continúe tomando MONTELUKAST APHAR 10 mg durante el tiempo que su médico se lo recete. Ayudará a controlar su asma.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, MONTELUKAST APHAR 10 mg puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

En ensayos clínicos realizados con montelukast 10 mg comprimidos recubiertos con película, los efectos adversos relacionados con la administración del medicamento y notificados con más frecuencia (en más de 1 de cada 100, o en menos de 1 de cada 10 pacientes tratados), fueron:

- dolor abdominal
- dolor de cabeza

Estos efectos adversos fueron por lo general leves y se produjeron con una frecuencia mayor en pacientes tratados con montelukast que con placebo (una pastilla que no contiene medicamento).

Además, desde que el medicamento está comercializado, se han notificado los siguientes efectos adversos:

- reacciones alérgicas que incluyen erupción cutánea, hinchazón de la cara, labios, lengua, y/o garganta que puede causar dificultad para respirar o para tragar, picor, y urticaria
- cansancio, inquietud, excitación incluyendo comportamiento agresivo, irritabilidad, temblor, depresión y acciones suicidas (en casos muy raros), mareo, somnolencia, alucinaciones, alteraciones del sueño, incluyendo pesadillas y problemas de sueño, hormigueo/adormecimiento, convulsiones
- malestar, dolor articular o muscular, calambres musculares, sequedad de boca, náuseas, vómitos, indigestión, diarrea, hepatitis
- mayor posibilidad de hemorragia, hematoma, bultos rojos dolorosos bajo la piel que de forma más frecuente aparecen en sus espinillas (eritema nodoso), palpitaciones
- hinchazón
- ansiedad
- sangrado nasal
- fiebre
- infección de las vías respiratorias altas

En pacientes asmáticos tratados con montelukast, se han notificado casos de una combinación de síntomas tales como enfermedad parecida a la gripe, hormigueo o adormecimiento de brazos y piernas, empeoramiento de los síntomas pulmonares y/o erupción cutánea (síndrome de Churg- Strauss). Debe comunicarle inmediatamente a su médico si tiene uno o más de estos síntomas.

Pregunte a su médico o farmacéutico para mayor información sobre efectos adversos. Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE MONTELUKAST APHAR 10 mg

- Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
 - No utilice este medicamento después de la fecha representada por los seis números después de CAD que aparece en el blister. Los dos primeros números indican el mes; los últimos cuatro números indican el año. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.
 - Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz y la humedad.
- Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de MONTELUKAST APHAR 10 mg:

- El principio activo es montelukast. Cada comprimido de montelukast sódico que corresponde a 10 mg de montelukast.

• Los demás componentes son:

Núcleo:

Lactosa monohidrato, celulosa microcristalina(E 460), croscarmelosa sódica(E468), hidroxipropilcelulosa(E463), estearato de magnesio. (E 572)

Recubrimiento:

Hipromelosa(E 464), dióxido de titanio (E 171), macrogol 400, óxido férrico amarillo (E 172), óxido férrico rojo(E 172), óxido férrico negro (E 172).

Aspecto del producto y contenido del envase

Los comprimidos son cuadrados redondeados de color marrón, recubiertos con película con la inscripción "MTS" en una cara y «10» en el otro lado.

Tamaños de envases: 14, 20, 28, 49, 50, 100 comprimidos recubiertos con película.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

Reddy Pharma Iberia S.L.

C/ Chile, 10

28290, Las Matas,

Madrid

Responsable de fabricación:

Dr. Reddy laboratorios (UK) Ltd.

6, Riverview Road, Beverley, East Yorkshire HU 17 0LD

Reino Unido

Este medicamento está autorizado en los estados miembros del Espacio Económico Europeo con los siguientes nombres:

NL : Montelukast Dr. Reddy's 10 mg tabletten

DE: Montelukast beta 10 mg Filmtabletten

ES: MONTELUKAST APHAR 10 mg Comprimidos recubiertos con película EFG

UK: Montelukast sodium 10mg film-coated Tablet

IT: Montelukast Dr. Reddy's 10 mg compresse rivestite con film

RO: STANGEN 10 mg, comprimate filmate

FR: MONTELUKAST DR REDDY'S 10 mg, comprimé pelliculé

Este prospecto ha sido aprobado en 21 de Junio de 2010

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>